



中华人民共和国国家标准

GB/T 25240—2010

烟草包衣丸化种子

Pelleted seed of tobacco

2010-09-26 发布

2011-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准是在 YC/T 141—1998《烟草包衣丸化种子》的基础上进行的修订。

本标准的附录 A 为规范性附录,附录 B 为资料性附录。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会农业分技术委员会(SAC/TC 144/SC 2)归口。

本标准起草单位:中国烟叶公司、玉溪中烟种子有限责任公司、云南省烟草农业科学研究院。

本标准主要起草人:刘建利、李永平、马文广、郑昀晔、宋利民、余砚碧、陈云松。

烟草包衣丸化种子

1 范围

本标准规定了烟草包衣丸化种子的定义、技术要求、检验方法及规程、包装与标识等。
本标准适用于烟草包衣丸化种子。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 21138 烟草种子

YC/T 20 烟草种子检验规程

YC/T 22 烟草种子贮藏与运输

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

烟草包衣丸化种子 pelleted seed of tobacco

用种衣剂包裹后形成丸粒化的烟草种子。

3.2

发芽势 germination energy

烟草包衣丸化种子发芽初期(7 d)正常发芽种子数占供检包衣丸化种子数的百分率,用%表示。

3.3

发芽率 germination percent

烟草包衣丸化种子在发芽终期(14 d)全部正常发芽种子数占供检包衣丸化种子数的百分率,用%表示。

3.4

含水量 moisture content

烟草包衣丸化种子样品中水分的质量占供检包衣丸化种子样品质量的百分率,用%表示。

3.5

有籽率 seed containing rate

烟草包衣丸化种子有裸种的粒数占被检验包衣丸化种子总粒数的百分率,用%表示。

3.6

单籽率 single seed rate

每粒烟草包衣丸化种子中只有单粒裸种的粒数占被检验包衣丸化种子总粒数的百分率,用%表示。

3.7

裂解率 splitting decomposition rate

烟草包衣丸化种子置于湿润滤纸上,3 min 内包衣(种衣剂)裂解的粒数占供试包衣丸化种子总粒数的百分率,用%表示。