



中华人民共和国国家标准

GB/T 21533—2008

GB/T 21533—2008

蜂蜜中淀粉糖浆的测定 离子色谱法

Determination of starch syrup in honey—Ion chromatography

中华人民共和国
国家标准

蜂蜜中淀粉糖浆的测定 离子色谱法

GB/T 21533—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 10 千字
2008年6月第一版 2008年6月第一次印刷


*

书号：155066·1-31684 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533



GB/T 21533-2008

2008-04-09 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局提出。

本标准由中华全国供销合作总社归口。

本标准起草单位:大连市产品质量监督检验所。

本标准主要起草人:潘炜、王春燕、郑顺利、于利军、牟世芬、张明、李鹏、董广彬、李海燕、姜俊。

本标准为首次发布。

附录 A
(资料性附录)
蜂蜜中淀粉糖浆测定的相关色谱图

蜂蜜中淀粉糖浆的测定 离子色谱法




图 A.1 麦芽糖标准混合使用液定位谱图




图 A.2 麦芽糖定位图与纯洋槐、枣花、椴树、荆条、油菜蜜的寡糖谱图

1 范围

本标准规定了蜂蜜中果葡糖浆、麦芽糖浆、异麦芽糖浆、饴糖浆等淀粉糖浆的测定方法。

本标准适用于蜂蜜中淀粉糖浆的测定。

本标准检出限:5%淀粉糖浆。

2 原理

蜂蜜中不含五糖(DP5)以上的寡糖,而各种淀粉糖浆中均含五糖(DP5)以上的寡糖,使用凝胶体积排阻法去除样品中果糖、葡萄糖,将寡糖富集后直接经阴离子交换色谱-电化学检测器检测,将五糖(DP5)以上寡糖的存在作为蜂蜜中淀粉糖浆的判定指标。

3 试剂和材料

除非另有说明,所用试剂为分析纯,所用水为 $18.2\text{ M}\Omega/\text{cm}$ 的高纯水。

3.1 聚丙烯酰胺凝胶微球,粒径 $45\text{ }\mu\text{m}\sim 90\text{ }\mu\text{m}$,分级分离的相对分子质量范围 $100\sim 1\ 800$,按使用说明书进行水化和脱气。

注:可使用 Bio-Gel® P-2 Gel 型聚丙烯酰胺凝胶或同等性能的凝胶材料。

3.2 凝胶层析柱:将聚丙烯酰胺凝胶(3.1)湿法装入 $1.5\text{ cm}\times 15\text{ cm}$ 空柱管中,装入的凝胶高度为 10 cm ,上端保持 1 cm 以上的水层,避免干涸。

3.3 层析柱架。

3.4 麦芽糖标准储备液:分别称取色谱纯麦芽糖、麦芽三糖、麦芽四糖、麦芽五糖、麦芽六糖、麦芽七糖标准物质各 10.0 mg ,用水分别溶解定容至 10 mL ,配制成浓度为 1 mg/mL 的储备液,于棕色瓶中 4°C 下储存。

3.5 麦芽糖标准混合使用液:吸取一定量的麦芽糖标准储备液(3.4),按表1用水配制麦芽糖标准混合使用液,在 4°C 下保存不超过 30 d 。该溶液用于样品色谱图中寡糖保留时间的定位。

表 1 麦芽糖标准混合使用液的配制

标准物质	麦芽糖	麦芽三糖	麦芽四糖	麦芽五糖	麦芽六糖	麦芽七糖
储备液吸取量/mL	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	1.00
定容体积/mL						10
混合使用液浓度/($\mu\text{g/mL}$)	10	20	30	40	50	100

3.6 50%氢氧化钠储备液:符合离子色谱使用纯度。

3.7 无水乙酸钠:符合离子色谱使用纯度。

3.8 $0.45\text{ }\mu\text{m}$ 样品滤膜:水性。

4 仪器

4.1 离子色谱仪:配电化学检测器。

4.2 分析天平:感量 0.1 mg 。

5 试样制备

5.1 称取混匀的蜂蜜 2.0 g 作为试样,用水溶解后定容至 20 mL ,用 $0.45\text{ }\mu\text{m}$ 水性滤膜过滤,滤液