



中华人民共和国国家标准

GB/T 14629.2—2008
代替 GB/T 14629.2—1993

三 北 羔 皮

Persin lamb skins

中华人民共和国
国家标准
三 北 羔 皮
GB/T 14629.2—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 7 千字
2008 年 11 月第一版 2008 年 11 月第一次印刷


*

书号：155066·1-34201 定价 10.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533



GB/T 14629.2-2008

2008-07-31 发布

2009-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

2.11

杯型卷

毛股成螺旋式,形似杯状。

2.12

豌豆型卷

毛股的顶端扭成小结,形似豌豆状。

3 部位划分

三北羔皮的部位划分见图1。




图1 部位划分示意图

4 要求**4.1 毛色比差**

黑色 100%, 灰色 120%, 杂色(纯一色)80%, 杂色(花色)60%。

4.2 分级

三北羔皮的分级要求见表1。

表1 分级

等级	感官要求	缺陷规定	面积/cm ²
一级	光泽、毛色、密度、丝性正常,毛卷坚实,花纹清晰,分布均匀,头颈四肢有花纹。正身部位有 75%以上弹性良好的卧蚕型卷;或全部被毛为排列整齐而规则的蠶型卷或肋型卷	正身部位无任何伤残。其他部位可有折痕、撕破口,不超过两处,总长度不超过 5 cm; 刀洞、虫蚀、鼠咬等不超过两处,总面积不超过 5 cm	≥1 000
二级	光泽、毛色、密度、丝性正常,毛卷坚实,花纹清晰,分布均匀。正身部位有 50%以上弹性良好的卧蚕型卷;或正身部位有 75%以上较松的卧蚕型卷;或正身部位排列不整齐或不规则的蠶型卷或肋型卷		≥1 000
三级	光泽、毛色、密度、丝性正常。正身部位有 25%以上弹性良好的卧蚕型卷,或正身部位有 50%以上较松的卧蚕型卷;或正身部位为弹性良好的环型卷、半环型卷		≥800
四级	具备三北羔皮毛卷特征,不符合一级、二级、三级要求者		—

注1: 灰色被毛的羔羊皮,要求可低于黑色的一个等级。
注2: 外观符合要求,伤残超过规定的,降一级。
注3: 花皮、不符合级内要求、有脱毛或胶板等缺陷者为等外皮。

前言

本标准代替 GB/T 14629.2—1993《裘皮 三北羔皮》。

本标准与 GB/T 14629.2—1993 相比,主要变化如下:

- 将标准名称修改为“三北羔皮”;
- 将“术语”中的通用术语取消,保留专有术语;
- 取消“要求”中的“加工要求”、“等级比差”;
- 修改了“检验规则”;
- 简化了“包装、运输、贮存”要求。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国皮革工业标准化技术委员会(SAC/TC 252)归口。

本标准起草单位:银杉皮草有限公司。

本标准主要起草人:陆荣坤、李雪海。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 14629.2—1993。

三 北 羔 皮

1 范围

本标准规定了三北羔皮的术语和定义、要求、检验方法、检验规则及包装、运输、贮存。

本标准适用于经宰杀后未经处理、或仅经过简单干燥、或经过盐腌、或经过适当保藏处理的生三北羔皮。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

三北羔皮

我国西北、华北、东北等地区,纯种及改良杂交的三北羊所产的羔羊皮,一般在羔羊出生后 1 d~3 d 内屠宰取皮(如被毛较短,可适当延长屠宰时间)。

2.2

毛色正常

以纯黑色、中灰色为正常。

2.3

密度正常

不露皮板,手感适中。

2.4

丝性正常

被毛柔软,如丝绸般的光滑。

2.5

弹性良好

毛卷坚挺,受外力作用后能恢复。

2.6

卧蚕型卷

毛卷向里卷曲,形似卧蚕状。

2.7

鬣型卷

毛卷自中线向两侧成锐角排列。

2.8

肋型卷

毛卷排成肋骨状,呈“厂”字形,宽度大于高度。

2.9

环型卷

被毛有足够的长度,与皮板平行卷曲成环型。

2.10

半环型卷

被毛长度不足,与皮板平行卷曲,未形成环状。