

SN

中华人民共和国进出口商品检验行业标准

SN 0173—92

出口食品副溶血性弧菌检验方法

Method for detection of *Vibrio*
Parahaemolyticus in food for export

1992-12-28 发布

1993-05-01 实施

中华人民共和国国家进出口商品检验局 发布

(京)新登字 023 号

出口食品副溶血性弧菌检验方法

SN 0173—92

Method for detection of *Vibrio*
Parahaemolyticus in food for export

代替 ZB X04 002—86

1 主题内容与适用范围

本标准规定了海产食品中副溶血性弧菌检验方法。

本标准适用于海产食品中副溶血性弧菌检验,其他食品可参照使用。

2 设备与材料

- 2.1 试管:17 mm×170 mm、15 mm×150 mm、10 mm×100 mm。
- 2.2 吸管:1 mL、10 mL。
- 2.3 培养皿:直径90 mm。
- 2.4 广口瓶或三角瓶。
- 2.5 电动均质器。
- 2.6 电动试管振荡器。
- 2.7 37℃恒温箱。
- 2.8 42℃恒温水浴箱。
- 2.9 试管架。

3 培养基及试剂

- 3.1 30 g/L 氯化钠稀释液:见9.1。
- 3.2 60 g/L 氯化钠蛋白胨水(PW):见9.2。
- 3.3 氯化钠多粘菌素 B 肉汤(SPB):见9.3。
- 3.4 硫代硫酸钠、柠檬酸钠、胆盐、蔗糖琼脂(TCBS):见9.4。
- 3.5 氯化钠三糖铁琼脂(TSI):见9.5。
- 3.6 嗜盐性试验用胰胨水(TB):见9.6。
- 3.7 胰胨大豆琼脂斜面(TSA):见9.7。
- 3.8 靛基质试验用培养基(I):见9.8。
- 3.9 氨基酸试验用培养基:见9.9。
- 3.10 V-P 半固体琼脂(VP):见9.10。
- 3.11 糖类分解试验用培养基:见9.11。
- 3.12 42℃生长试验用培养基:见9.12。
- 3.13 O/F 试验用培养基(HLGB):见9.13。
- 3.14 神奈川现象试验用我妻氏琼脂(WA):见9.14。