

WS/T 239—2004

Arch Occup Environ Health, 1987, 59(3): 243-250.

[22] Simon P, Nicot T, Dieudonne M, et al. Dietary habits, a non-negligible source of 2-thiothiazolidine-4-carboxylic acid and possible overestimation of carbon disulfide exposure. Int Arch Occup Environ Health, 1994, 66(2): 85-90.

[23] U. S. Public Health Service, U. S. Department of Health and Human Services. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). Toxicological Profile for Carbon Disulfide. 1992.

[24] Van Doorn R, Delbressine LP, Leijdekkers CM, et al. Identification and determination of 2-thiothiazolidine-4-carboxylic acid in urine of workers exposed to carbon disulfide. Arch Toxicol, 1981, 47(1): 51-58.

[25] Van. Poucke L, Van. Peteghem C, Vanhoorne M. Accumulation of carbon disulphide metabolites. Int Arch Occup Environ Health, 1990, 62(6): 479-482.

[26] Van. Welie RT, Van. Duyn P, Lamme EK, et al. Determination of tetrahydrophthalimide and 2-thiothiazolidine-4-carboxylic acid, urinary metabolites of the fungicide captan, in rats and humans. Int Arch Occup Environ Health, 1991, 63(3): 181-186.

[27] WHO. Environmental Health Criteria 10, Carbon disulfide, Geneva: WHO 1979.

WS/T 239—2004

ICS 13.100
C 52

WS

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 239—2004

职业接触二硫化碳的生物限值

Biological limit value for occupational exposure to carbon disulfide



WS/T 239—2004

版权专有 侵权必究

*

书号: 155066 · 2-15764

定价: 8.00 元

2004-04-07 发布

2004-10-01 实施

中华人民共和国卫生部 发布

参 考 文 献

- 中华人民共和国卫生
行业 标 准
职业接触二硫化碳的生物限值
WS/T 239—2004
*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
网址 www.bzcb.com
电话:68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 10 千字
2004年7月第一版 2004年7月第一次印刷
*
书号: 155066·2-15764 定价 8.00 元
- 如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533
- [1] 陈德明,马林.尿 2-硫代噻唑烷-4-羧酸用于二硫化碳作业工人生物监测研究.职业医学,1995,22(2):11-13.
- [2] 陈苘,胡迪生,简乐,等.二硫化碳作业工人的肾功能观察.中国工业医学杂志,1997,10(6):325-327.
- [3] 高艳华,杨红光,梁友信,等.接触 CS₂ 工人的神经行为改变及生物学监测.中华劳动卫生职业病杂志,1996,14(5):284-286.
- [4] 顾祖维.国外生物接触限值及某些标志物的半减期.沈惠麒,顾祖维,吴宜群.编著,生物监测理论基础及应用.北京:北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社,1996.352-358.
- [5] 桂宝康主编(译),职业卫生与安全百科全书(上).北京·上海:中国大百科全书出版社,1987.276.
- [6] 简乐,王红妹,曹文俊,等.尿中 2-硫代噻唑烷-4-羧酸排泄规律初探.中国公共卫生学报,1997,16(4):240-241.
- [7] 简乐.尿 2-硫代噻唑烷-4-羧酸的反相高效液相色谱法研究.卫生研究,1995,24(5):257-259.
- [8] 简乐.饮酒对尿 2-硫代噻唑烷-4-羧酸排泄的影响.中华劳动卫生职业病杂志,2000,18(6):357-359.
- [9] 屈家瑛,黄磊,张如午,等.高效液相色谱法测定尿中 2-硫代噻唑烷-4-羧酸浓度.上海医科大学学报,1987,14(4):293-296.
- [10] 沈惠麒,张捷,寇丽筠,等.尿中 2-硫代噻唑烷-4-羧酸高压液相色谱测定法.工业卫生与职业病,1989,15(6):367-368.
- [11] 杨杏芬,庄志雄,马林,等.二硫化碳慢性接触对儿茶酚胺类代谢的影响.中华劳动卫生职业病杂志,1996,14(1):28-30.
- [12] 姚玉斌,赵振新,黄玉芬,等.某化纤厂 CS₂ 废气对居民健康影响调查.环境与健康杂志,1995,12(3):115-117.
- [13] 张金松,黄金祥,陈娱,等.二硫化碳作业工人监测指标的探讨.中国工业医学杂志,1990,3(2):28-29.
- [14] 钟赛贤,杨成峰,余贵英.尿 TTCA 检测在非职业性 CS₂ 暴露人群生物学监测中价值的初探.广西预防医学,1997,3(2):94-95.
- [15] 周志俊,屈家瑛,徐德祥,等.尿 2-硫代噻唑烷-4-羧酸用于二硫化碳接触生物监测研究.上海医科大学学报,1989,16(6):449-453.
- [16] Campbell L, Jones AH, Wilson HK, et al. Evaluation of occupational exposure to carbon disulfide by blood, exhaled air, and urine analysis, Am J Ind Med, 1985, 8(2):143-153.
- [17] Jian L, Chao WJ. Cigarette Smoking and Urinary Organic Sulfides. Biomed Environ Science, 2000, 13(1):7-11.
- [18] Kikuchi Y, Uemura T, Yamauchi T, et al. Urinary excretion of TTCA after intake of brassica vegetables. Occup Health, 2002, 44(3):151-155.
- [19] Kotseva K, Braeckman L, De Bacquer D, et al. Cardiovascular effects in viscose rayon workers exposed to carbon disulfide. Int J Occup Environ Health, 2001, 7(1):7-13.
- [20] Pergal M, Vukojevic N, Djuric D, et al. Carbon disulfide metabolites excreted in the urine of exposed workers. Arch Environ Health, 1972, 25(1):38-44.
- [21] Rosier J, Veulemans H, Masschelein R, et al. Experimental human exposure to carbon disulfide II. Urinary excretion of 2-thiothiazolidine-4-carboxylic acid (TTCA) during and after exposure. Int

附录 A
(资料性附录)

正确使用本标准的说明

A.1 适用范围

本标准适用于职业接触二硫化碳劳动者的生物监测,如粘胶纤维(人造丝)生产工、赛璐玢(玻璃纸)生产工、以二硫化碳为原料生产四氯化碳、橡胶硫化剂、农药和药物的劳动者及实验室中以二硫化碳作溶剂的操作者等。

A.2 生物监测指标的选择

尿 2-硫代噻唑烷-4-羧酸(TTCA)是二硫化碳的代谢产物,其与空气中二硫化碳浓度密切相关。国内已建立尿 TTCA 的标准检测方法,加上尿样采集方便、无损伤性,故本标准推荐尿 TTCA 作为职业接触二硫化碳的生物监测指标。

A.3 监测结果的评价

A.3.1 尿 TTCA 测定结果主要用于职业接触的群体评价。

A.3.2 当尿 TTCA 超过职业接触生物限值时,表示劳动者近期有过量接触。

A.3.3 本标准提出的尿 TTCA 测定结果结合工作场所空气中二硫化碳浓度监测结果可较全面评价工作场所劳动卫生条件和劳动者的接触水平。

A.4 监测检验要求

A.4.1 工作班末尿指下班前 1 h 内尿。

A.4.2 吸烟、饮酒、食用十字花科类食物如包心菜或某些药物如戒酒硫等可影响尿 TTCA 水平,采样前一天起应避免接触上述影响因素。

前 言

本标准根据流行病学调查和现场劳动卫生学调查资料,并参考国外职业接触生物限值后提出,为职业接触二硫化碳的生物监测卫生标准。

本标准的附录 A 是资料性附录。

本标准由卫生部卫生法制与监督司提出。

本标准起草单位:浙江大学医学院公共卫生系劳动卫生与环境卫生研究所。

本标准主要起草人:简乐、陈苕。

本标准由卫生部委托中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所负责解释。