

ICS 11.020
C 05

WS

中华人民共和国卫生行业标准

WS 338—2011

WS 338—2011

乳腺癌诊断

Diagnosis criteria for breast cancer

中华人民共和国卫生
行业标准
乳腺癌诊断
WS 338—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 21 千字
2011年8月第一版 2011年8月第一次印刷

*

书号: 155066·2-22205 定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



WS 338—2011

2011-08-12 发布

2012-02-01 实施

中华人民共和国卫生部 发布

后未行腋窝淋巴结清扫,以(sn)表示前哨淋巴结,如 pN0(i⁺)(sn);

- 孤立肿瘤细胞指单个肿瘤细胞或小于 0.2 mm 的小细胞团,通常由免疫组化或分子生物学方法发现,并经常规组织学鉴定,孤立肿瘤细胞通常不显示转移活性,如增殖或间质反应。

C.5 临床分期见表 C.1

表 C.1 临床分期

0 期	Tis	N0	M0
I 期	T1	N0	M0
II A 期	T0	N1	M0
	T1	N1	M0
	T2	N0	M0
II B 期	T2	N1	M0
	T3	N0	M0
	T0	N2	M0
III A 期	T1	N2	M0
	T2	N2	M0
	T3	N1-2	M0
	T4	N0	M0
III B 期	T4	N1	M0
	T4	N2	M0
	任何 T	N3	M0
III C 期	任何 T	任何 N	M0
IV 期	任何 T	任何 N	M1
注: T 表示原发肿瘤;N 表示区域淋巴结;M 表示远处转移。			

前 言

本标准中 5.1、5.2、5.3、5.5、第 6 章为强制性条款,其余为推荐性条款。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由卫生部医疗服务标准专业委员会提出。

本标准由中华人民共和国卫生部批准。

本标准主要起草单位:中山大学附属第一医院。

本标准参加起草单位:广东省妇幼保健院、中山大学附属肿瘤医院、第三军医大学西南医院、北京协和医院、南京医科大学附属医院、复旦大学附属肿瘤医院、中国协和医科大学肿瘤医院、北京 307 医院、北京大学人民医院、重庆医科大学附属第一医院、中山大学附属第二医院、广东省人民医院。

本标准主要起草人:王深明。

本标准参加起草人:王颀、杨名添、姜军、孙强、王水、邵志敏、徐兵河、江泽飞、张嘉庆、任国胜、苏逢锡、廖宁。

附录 C
(规范性附录)

国际抗癌联盟(UICC) 颁布乳腺癌 TNM 分期

C.1 原发肿瘤(T)

C.1.1 Tx 原发肿瘤无法评估。

C.1.2 T0 没有原发肿瘤证据。

C.1.3 Tis 原位癌

- Tis(DCIS) 导管原位癌；
- Tis(LCIS) 小叶原位癌；
- Tis(Paget's) 不伴肿块的乳头派杰氏病。

注：伴有肿块的派杰氏病根据肿块大小进行分期。

C.1.4 T1 肿瘤最大直径 ≤ 2 cm

- T1mic 微小浸润性癌,最大直径 ≤ 0.1 cm；
- T1a 肿瘤最大直径 > 0.1 cm, ≤ 0.5 cm；
- T1b 肿瘤最大直径 > 0.5 cm, ≤ 1.0 cm；
- T1c 肿瘤最大直径 > 1.0 cm, ≤ 2.0 cm。

C.1.5 T2 最大直径 > 2.0 cm, ≤ 5.0 cm。

C.1.6 T3 最大直径 > 5.0 cm。

C.1.7 T4 肿瘤不论大小,直接侵犯胸壁(a)或皮肤(b)

- T4a 侵犯胸壁(胸壁包括肋骨、肋间肌、前锯肌,但不包括胸肌)；
- T4b 患侧乳房皮肤水肿(包括橘皮样变),溃疡或卫星状结节；
- T4c T4a 和 T4b 并存；
- T4d 炎性乳腺癌。

C.2 区域淋巴结(N)

C.2.1 临床分期

C.2.1.1 Nx 区域淋巴结无法评估(例如曾经切除)。

C.2.1.2 N0 无区域淋巴结转移。

C.2.1.3 N1 同侧腋窝淋巴结转移,可活动。

C.2.1.4 N2 同侧腋窝淋巴结转移,融合或固定;或临床无证据显示腋窝淋巴结转移的情况下,临床发现内乳淋巴结转移。

- N2a 同侧腋窝淋巴结转移,相互融合,或与其他组织固定；
- N2b 仅临床上发现内乳淋巴结转移,而无腋窝淋巴结转移的临床证据。

C.2.1.5 N3 同侧锁骨下淋巴结转移或不伴腋窝淋巴结转移;或有临床证据显示同侧腋窝淋巴结转移和内乳淋巴结转移;或同侧锁骨上淋巴结转移,伴或不伴腋窝淋巴结或内乳淋巴结转移。

乳腺癌诊断

1 范围

本标准规定了乳腺癌的诊断及乳腺癌的分期。

本标准适用于全国各级各类医疗卫生机构及其医务人员对乳腺癌的诊断。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

乳腺癌 TNM 分期 国际抗癌联盟(UICC)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

乳腺癌 breast cancer

起源于乳腺上皮组织的恶性肿瘤。

3.2

绝经 menopause

月经的永久性终止,且满足以下任意一条则可以推断为绝经:

- a) 双侧卵巢切除术后；
- b) 年龄 ≥ 60 岁；
- c) 年龄 < 60 岁,停经 ≥ 12 月,且卵泡刺激素及雌二醇水平持续在绝经后的范围内。

3.3

隐匿性乳腺癌 occult breast cancer

一类以腋窝淋巴结转移性癌为表现,无其他部位原发癌的证据,但临床体检和常用的影像学检查均不能发现乳腺内病灶的特殊类型乳腺癌,甚至术后病理可能也未能发现乳腺癌灶。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ER: 雌激素受体(estrogen receptor)

PR: 孕激素受体(progesterone receptor)

HER-2: 人类表皮生长因子 2 型受体(human epidermal growth factor receptor 2)

MRI: 核磁共振(magnetic resonance imaging)