

### 阴道毛滴虫病诊断

Diagnosis of trichomoniasis vaginalis

行业标准信息服务平台

2017 - 08 - 01 发布

2018 - 02 - 01 实施

---

## 前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准起草单位：浙江省医学科学院寄生虫病研究所、中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所、中国人民解放军第二军医大学、浙江省景宁县疾病预防控制中心。

本标准主要起草人：闻礼永、严晓岚、郑彬、朱淮民、熊彦红、张剑锋、朱芝娟、周晓农。

行业标准信息服务平台

# 阴道毛滴虫病诊断

## 1 范围

本标准规定了阴道毛滴虫病的诊断依据、诊断原则、诊断和鉴别诊断。  
本标准适用于全国各级医疗机构和疾病预防控制机构对阴道毛滴虫病的诊断。

## 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 2.1

**阴道毛滴虫** *Trichomonas vaginalis*

一种寄生于人体泌尿生殖系统，主要寄生于女性阴道和男性尿道的鞭毛虫，可引起阴道毛滴虫感染或病症（参见附录 A）。

### 2.2

**阴道毛滴虫感染** *trichomonas vaginalis infection*

阴道或前列腺分泌物、尿液沉淀物镜检发现阴道毛滴虫滋养体，但感染者未见相应临床表现。

### 2.3

**阴道毛滴虫病** *trichomoniasis vaginalis*

阴道毛滴虫感染者出现相应临床表现。

## 3 诊断依据

### 3.1 流行病学史

有共用卫生洁具史，或有不安全性生活史，或性伴侣有阴道毛滴虫感染史等（参见附录 B）。

### 3.2 临床表现

3.2.1 阴道感染的潜伏期为 4d~28d，阴道分泌物大量增加，呈泡沫样，有异味。常引起外阴瘙痒、灼热、性交疼痛等。阴道检查有触痛，可见阴道及子宫颈黏膜弥漫性充血红肿等（参见附录 C 的 C.1）。

3.2.2 尿道感染可表现为尿频、尿急、尿痛等症状，可伴有局部疼痛等（参见附录 C 的 C.2）。

3.2.3 前列腺感染可表现为尿道灼热、夜尿增多，排尿末尿道口有白色混浊分泌物滴出，直肠坠胀感