

GB 5946—86

本标准适用于三河牛品种鉴别和等级评定。

1 品种特性和外貌特征**1.1 品种特性**

三河牛是在内蒙古呼伦贝尔草原上育成的乳肉兼用品种。

三河牛适用性强、耐粗饲、耐高寒、抗病力强、宜牧、乳脂率高、遗传性能稳定。

1.2 外貌特征

三河牛毛色有红、（黄）白花和黑白花，体大结实，结构匀称，肌肉适度，骨骼健壮，性情温驯，公牛雄相明显，头大小适中，颈肩结合良好，胸部较深，背腰平直，母牛腹大不下垂，公牛适中，公牛尻部宽广平直，母牛荐部稍显隆起，四肢健壮，肢势端正，蹄质坚实，乳房大小中等，质地良好，乳静脉弯曲明显，乳头大小适中。

2 生产性能（下限）**2.1 产乳量指标，见表1。**

表 1 母牛305天产乳量

kg

胎次→ 等级 ↓	一	二	三	四	五
特	3000	3800	4300	4600	4800
一	2600	3200	3600	3800	4000
二	2000	2400	2700	2900	3000
三	1500	1700	1800	1900	2000

2.2 乳脂率

乳脂率4%，但各胎次产乳量每增加1000kg，可允许乳脂率降低0.1%。

2.3 产肉性能

1.8月龄以上公、阉牛经过短期育肥后，屠宰率为55%，净肉率为45%。

3 体尺、体重标准（下限）**3.1 成年牛体尺标准，见表2。**

表 2

cm